

尺寸：105×147mm

正大九力®
九力
Glucosamine Hydrochloride Tablets



盐酸氨基葡萄糖片说明书

请仔细阅读说明书并按使用说明或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：盐酸氨基葡萄糖片
商品名称：九力
英文名称：Glucosamine Hydrochloride Tablets
汉语拼音：Yansuan Anjiputaotang Pian

【成份】

本品每片含盐酸氨基葡萄糖0.75克。辅料为：微晶纤维素、低取代羟丙纤维素、羟丙甲纤维素、玉米淀粉、硬脂酸镁。

【性状】

本品为薄膜衣片，除去包衣后显类白色。

【作用类别】

本品为镇痛类非处方药品。

【适应症】

用于治疗 and 预防全身所有部位的骨关节炎，包括膝关节、肩关节、髋关节、手腕关节、颈及椎关节和踝关节等。可缓解和消除骨关节炎的疼痛、肿胀等症状，改善关节活动功能。

【规格】

0.75克（以盐酸氨基葡萄糖计）

【用法用量】

口服，一次1片，一日2次，吃饭时或饭后服用。6周为一个疗程或根据需要延长。每年重复治疗2-3次。

【不良反应】

轻度的胃肠不适，如恶心、便秘、腹胀、腹痛和腹泻；轻度的头痛、乏力和困倦，偶见轻度嗜睡；有些患者可能出现过敏反应，包括皮疹、瘙痒和皮肤红斑。此外，有引起视觉障碍、脱发、支气管哮喘和血糖升高的报道。

【禁忌】

- 1、孕妇和哺乳期妇女禁用。
- 2、对盐酸氨基葡萄糖或本品任何辅料过敏的患者禁用。
- 3、由于本品的活性成分是自甲壳类获得的，因此，对甲壳类过敏的患者，禁止使用本品。

【注意事项】

- 1、本品宜在进餐时或餐后服用，可减少胃肠道不适，特别是有胃溃疡的患者。
- 2、严重肝、肾功能不全者慎用。
- 3、由于缺乏18岁以下儿童及青少年安全性与有效性的数据，故本品不应用于此类人群的治疗。
- 4、本品有引起血糖或血脂升高的报道。对于患有葡萄糖不耐受问题的患者，在开始治疗前及在治疗过程中，建议定期监测控制血糖，必要时给予胰岛素治疗。对患有心血管

血管疾病风险的患者中，推荐进行血脂的监测，因为在部分病例中，观察到接受氨基葡萄糖治疗的患者出现高胆固醇血症。

5、观察到哮喘患者开始氨基葡萄糖治疗后会引发哮喘症状恶化（当停止氨基葡萄糖给药后，上述状况消退），因此，初始使用氨基葡萄糖治疗的哮喘患者出现上述症状应及时停药并就医。

6、用药1个疗程后，症状未缓解，请咨询医师或药师。6周以上用药应由医师确定是否必要，如有必要延长用药时间，应在医师指导下用药。

7、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8、本品性状发生改变时禁止使用。

9、应将本品放在儿童接触不到的地方。

10、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1、本品可增加四环素类药物在胃肠道的吸收，减少口服青霉素或氯霉素的吸收。

2、同时服用非甾体抗炎药的患者可能需降低本品的服用剂量，或降低非甾体抗炎药的服用剂量。

3、本品与利尿药可能存在相互作用，两药同时服用时可能需增加利尿药的服用剂量。

4、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

骨关节炎是关节软骨蛋白多糖生物合成异常而呈现退行性变的结果。氨基葡萄糖是一种天然的氨基单糖，是蛋白多糖合成的前体物质。可以刺激软骨细胞产生有正常多聚体结构的蛋白多糖，提高软骨细胞的修复能力，抑制损伤软骨的酶如胶原酶和磷脂酶A2，并可防止损伤细胞的超氧化自由基的产生，可以促进软骨基质的修复和重建，从而可延缓骨关节疼痛的病理过程和疾病的进程，改善关节活动，缓解疼痛。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】

- (1) 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔包装，6片/板，2板/盒，3板/盒，4板/盒。
- (2) 口服固体药用高密度聚乙烯瓶，30片/瓶，1瓶/盒，2瓶/盒；90片/瓶，1瓶/盒；100片/瓶，1瓶/盒；120片/瓶，1瓶/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】YBH05342020

【批准文号】国药准字H20060647

【说明书修订日期】2022年08月29日

【上市许可持有人及生产企业】

上市许可持有人及生产企业名称：江苏正大清江制药有限公司

上市许可持有人及生产企业地址：江苏省淮安市韩泰北路9号

邮政编码：223001

电话号码：0517-83720288

传真号码：0517-83720288

服务热线：4008800195

网 址：<http://www.ctqjph.com>

如有疑问可与生产企业联系

220842-3